

I-MASK+

PROTOKOLL ZUR PROPHYLAXE UND FRÜHZEITIGEN AMBULANTEN BEHANDLUNG VON COVID-19

Seite 1/2

PROPHYLAXE-PROTOKOLL

Ivermectin	Prophylaxe für Hochrisikopersonen 0,2 mg/kg* – eine Dosis am 1. und 3. Tag, danach über 10 Wochen eine Dosis wöchentlich, im Anschluss alle 2 Wochen eine Dosis** Prophylaxe nach Kontakt mit COVID-19*** 0,2 mg/kg* – eine Dosis am 1. und 3. Tag
Vitamin D3	1.000–3.000 UI/Tag
Vitamin C	1.000 mg zweimal täglich
Quercetin	250 mg/Tag
Zink	50 mg/Tag
Melatonin	6 mg vor dem Schlafengehen (verursacht Müdigkeit)

FRÜHES AMBULANTES PROTOKOLL****

Ivermectin	0,2 mg/kg* – eine Dosis am 1. und 3. Tag
Vitamin D3	4.000 IU/Tag
Vitamin C	2.000 mg 2–3 mal täglich
Quercetin	250 mg zweimal täglich
Zink	100 mg/Tag
Melatonin	10 mg vor dem Schlafengehen (verursacht Müdigkeit)
Aspirin	325 mg/Tag (sofern nicht kontraindiziert)

* $\approx 0,09$ mg/lb pro Dosis (auf nüchternen Magen mit Wasser einnehmen). Beispiel für eine Person mit 60 kg (Körpergewicht): $60 \text{ kg} \times 0,2 \text{ mg} = 12 \text{ mg}$ – zur Berechnung der geeigneten Ivermectin-Dosis siehe Umrechnungstabelle (kg→lbs) auf Seite 2.

** Diese Dosierung kann aktualisiert werden, sobald weitere wissenschaftliche Studien vorliegen.

*** Zu verwenden, wenn ein Haushaltsmitglied COVID-19-positiv ist oder wenn Sie einem COVID-19-positiven Patienten über einen längeren Zeitraum ohne Tragen einer Maske ausgesetzt waren.

**** Für die letzte Phase – stationäre Patienten – siehe **MATH+ Hospital Treatment Protocol für COVID-19** der FLCCC Alliance unter www.flccc.net

Bitte beachten Sie unseren **Haftungsausschluss** und weitere Informationen auf Seite 2 dieser Datei.

Verhaltensprophylaxe



Tragen Sie eine Maske

Sie müssen in allen Innenräumen, in denen Sie sich in Gegenwart von Personen aufhalten, die nicht zu Ihrem Haushalt gehören, eine Stoffmaske, chirurgische Maske oder N95-Maske (ohne Ventil) tragen.

Sie müssen eine N95-Maske (ohne Ventil) tragen, wenn Sie über längere Zeit Personen außerhalb Ihres Hauses in einem geschlossenen oder schlecht belüfteten Raum ausgesetzt sind.



Abstand halten

Bis die Covid-19-Krise vorüber ist, empfehlen wir Ihnen, in der Öffentlichkeit einen Mindestabstand von etwa 2 m zwischen Ihnen und Personen außerhalb Ihres Hauses einzuhalten.



Hände waschen

Wir empfehlen Ihnen, sich nach einem Aufenthalt außerhalb Ihrer Wohnung (Einkaufen, U-Bahn usw.) gründlich die Hände zu waschen (20–30 Sek. mit Seife) oder zwischendurch auch ein Händedesinfektionsmittel zu verwenden.

I-MASK+

PROTOKOLL ZUR PROPHYLAXE UND FRÜHZEITIGEN AMBULANTEN BEHANDLUNG VON COVID-19

Seite 2/2

IVERMECTIN

Umrechnung des Körpergewichts (kg/lb) für die Ivermectin-Dosis zur Prophylaxe und Behandlung von VIDOC-19

Körpergewicht		Dose	
Umrechnung (1 kg ≈ 2.2 lbs)		0,2 mg/kg ≈ 0,09 mg/lb	
(Dosis berechnet nach der oberen Grenze des Gewichtsbereichs)		(Jede Tablette = 3 mg; Dosen gerundet zur nächsten halben Tablette oberhalb)	
70-90 lb	32-40 kg	8 mg	(3 Tabletten=9 mg)
91-110 lb	41-50 kg	10 mg	(3,5 Tabletten)
111-130 lb	51-59 kg	12 mg	(4 Tabletten)
131-150 lb	60-68 kg	13,5 mg	(4,5 Tabletten)
151-170 lb	69-77 kg	15 mg	(5 Tabletten)
171-190 lb	78-86 kg	16 mg	(5,5 Tabletten)
191-210 lb	87-95 kg	18 mg	(6 Tabletten)
211-230 lb	96-104 kg	20 mg	(7 Tabletten=21 mg)
231-250 lb	105-113 kg	22 mg	(7,5 Tabletten=22.5 mg)
251-270 lb	114-122 kg	24 mg	(8 Tabletten)
271-290 lb	123-131 kg	26 mg	(9 Tabletten=27 mg)
291-310 lb	132-140 kg	28 mg	(9.5 comprimés=28.5 mg)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Das I-MASK+-Prophylaxe- und frühzeitiges ambulantes Behandlungsprotokoll für COVID-19 und das MATH+ Klinik-Behandlungsprotokoll für COVID-19 dienen lediglich der Aufklärung über potenziell nützliche Therapien für COVID 19. Missachten Sie niemals professionellen medizinischen Rat wegen etwas, das Sie auf unserer Website und in unseren Publikationen gelesen haben. Diese Informationen sollen keine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung für einen Patienten ersetzen. Die Behandlung eines Patienten sollte auf dem Urteil Ihres Arztes oder einer anderen qualifizierten medizinischen Fachkraft beruhen. Lassen Sie sich bei Fragen zu Ihrer Gesundheit oder Ihrem Gesundheitszustand stets von ihnen beraten.

Eine Zusammenfassung der veröffentlichten Daten, die die Begründung für die Verwendung von Ivermectin in unserem I-MASK+-Protokoll unterstützen, kann unter www.flccc.net/i-mask-prophylaxis-treatment-protocol heruntergeladen werden.

Aktualisierungen, Referenzen und Informationen über die FLCCC Alliance, das I-MASK+-Prophylaxe- und frühzeitiges ambulantes Behandlungsprotokoll für COVID-19 und das MATH+ Klinik-Behandlungsprotokoll für COVID-19 finden Sie auf unserer Website.