

I-MASK+

PROTOCOLLO PROFILASSI E TRATTAMENTO AMBULATORIO PRECOCE PER COVID-19

P. 1/2

PROTOCOLLO PROFILASSI

| | |
|--------------------|--|
| Ivermectina | Profilassi per soggetti ad alto rischio 0,2 mg/kg* – una dose il giorno 1 e il giorno 3, poi assumere una dose settimanale per 10 settimane, e poi una dose ogni 2 settimane** |
| | Profilassi post esposizione a COVID-19*** 0,2 mg/kg* – una dose il giorno 1 e il giorno 3 |
| Vitamina D3 | 1.000-3.000 IU/al giorno |
| Vitamina C | 1.000 mg due volte al giorno |
| Quercetina | 250 mg/al giorno |
| Zinco | 50 mg/al giorno |
| Melatonina | 6 mg prima di coricarsi (provoca sonnolenza) |

PROTOCOLLO AMBULATORIO ANTICIPATO****

| | |
|--------------------|---|
| Ivermectina | 0,2 mg/kg* – una dose il giorno 1 e il giorno 3 |
| Vitamina D3 | 4.000 IU/al giorno |
| Vitamina C | 2.000 mg 2-3 volte al giorno |
| Quercetina | 250 mg due volte al giorno |
| Zinco | 100 mg/al giorno |
| Melatonina | 10 mg prima di coricarsi (provoca sonnolenza) |
| Aspirina | 325 mg/al giorno (salvo controindicazioni) |

* ≈ 0,09 mg/lb per dose (assumere a stomaco vuoto con acqua). Esempio per una persona di 60 kg (peso corporeo): 60 kg × 0,2 mg = 12 mg – vedere la tabella di conversione (kg→lbs) a pagina 2 per calcolare la dose appropriata di ivermectina.

** Questo dosaggio può essere aggiornato man mano che emergono ulteriori studi scientifici.

*** Da utilizzare se un membro della famiglia è positivo per COVID-19 o se si ha un'esposizione prolungata a un paziente positivo per COVID-19 senza indossare una maschera.

**** Per la fase tardiva – pazienti ospedalizzati – vedere il **MATH+ Protocollo di trattamento ospedaliero per COVID-19** del FLCCC Alliance su www.flccc.net


Si prega di consultare la nostra **esclusione di responsabilità** e ulteriori informazioni a pagina 2 di questo documento.

Profilassi
comportamentale



Indossare maschere

Indossare un panno, una maschera chirurgica o una maschera N95 (senza valvola) in tutti gli spazi interni con persone non domestiche. Indossare una maschera N95 (senza valvola) durante l'esposizione prolungata a persone non domestiche in qualsiasi area ristretta e scarsamente ventilata.



Mantenere le distanze

Fino alla fine della crisi del Covid-19, consigliamo di mantenere una distanza minima di ca. 2 m / 6 piedi in pubblico da persone che non sono della tua famiglia.



Lavare le mani

Consigliamo, dopo un soggiorno durante e dopo le uscite da casa (shopping, metropolitana, ecc.), un'accurata pulizia delle mani (20-30 secondi con sapone), o anche di utilizzare un disinfettante per le mani nel mezzo.

I-MASK+

PROTOCOLLO PROFILASSI E TRATTAMENTO AMBULATORIO PRECOCE PER COVID-19

P. 2/2

IVERMECTINA

Conversione del peso corporeo (kg/lb) per la dose di ivermectina nella profilassi e nel trattamento di covid-19

| Peso corporeo | | Dose | |
|---|------------|---|---------------------------|
| Conversione (1 kg ≈ 2,2 libbre) (dosi calcolate per il limite superiore dell'intervallo di peso) | | 0,2 mg/kg ≈ 0,09 mg/lb (ogni compressa = 3 mg; dosi arrotondate alla mezza compressa più vicina sopra) | |
| 70-90 lb | 32-40 kg | 8 mg | (3 compresse = 9 mg) |
| 91-110 lb | 41-50 kg | 10 mg | (3,5 compresse) |
| 111-130 lb | 51-59 kg | 12 mg | (4 compresse) |
| 131-150 lb | 60-68 kg | 13,5 mg | (4,5 compresse) |
| 151-170 lb | 69-77 kg | 15 mg | (5 compresse) |
| 171-190 lb | 78-86 kg | 16 mg | (5,5 compresse) |
| 191-210 lb | 87-95 kg | 18 mg | (6 compresse) |
| 211-230 lb | 96-104 kg | 20 mg | (7 compresse = 21 mg) |
| 231-250 lb | 105-113 kg | 22 mg | (7,5 compresse = 22.5 mg) |
| 251-270 lb | 114-122 kg | 24 mg | (8 compresse) |
| 271-290 lb | 123-131 kg | 26 mg | (9 compresse = 27 mg) |
| 291-310 lb | 132-140 kg | 28 mg | (9,5 tablets = 28.5 mg) |

DISCLAIMER

La **I-Mask+ Profilassi e protocollo di trattamento ambulatoriale precoce per COVID-19** e il **protocollo di trattamento ospedaliero MATH+ per COVID-19** sono esclusivamente a scopo educativo riguardo a terapie potenzialmente benefiche per COVID-19. Non ignorare mai la consulenza medica professionale a causa di qualcosa che hai letto sul nostro sito Web e sui rilasci. Non intende sostituire il consiglio, la diagnosi o il trattamento medico professionale nei confronti di alcun paziente. Il trattamento per un singolo paziente deve fare affidamento sul giudizio del proprio medico o di un altro operatore sanitario qualificato. Chiedi sempre il loro consiglio per qualsiasi domanda tu possa avere sulla tua salute o condizione medica.

Un riepilogo dei dati pubblicati che supportano la logica per l'uso dell'Ivermectina nel nostro protocollo I-MASK + può essere scaricato da www.flccc.net/i-mask-prophylaxis-treatment-protocol/

Per aggiornamenti, riferimenti e informazioni su **FLCCC Alliance, I-Mask+ Prophylaxis & Early Outpatient Treatment Protocol for COVID-19** e **MATH+ Hospital Treatment Protocol for COVID-19**, si prega di visitare il nostro sito web.